

Gloster

preparação para criação

É indispensável que a seleção das aves para criação já tenha sido feita. A época das exposições já terminou houve tempo para a escolha dos reprodutores.

Julho/Agosto

- Momento ideal de cortar as unhas, bem como as penas em redor do sexo dos pássaros, assim como os topetes.

- Momento indicado para iniciar tratamentos preventivos ou prolongamento artificial da luz.

Preparação dos machos:

Pelo prolongamento artificial da luz, é possível colocar pássaros prematuramente em condição de criar.

Separam-se os machos nos registros de criação. O tempo de Luz é em média de 10 horas. Progressivamente, até o dia de acasalamento aumenta-se a luz para 15 horas, dá-se vitamina a base de Vit.E.

Os machos comem papa apenas uma vez por semana, para não ficarem gordos.

Preparação das fêmeas:

Separam-se as fêmeas em gaiolas de vôo (1,20 m). O tempo de luz é igual ao dos machos, mas elas devem ser colocadas num local com menos intensidade de luz (junto ao chão), o que permite oferecer-lhes uma alimentação mais estimulante tal como papa com sementes germinadas.

Acasalamento dos Reprodutores

Os criadores estão cheios de ansiedade para acasalar os passarinhos!!! Os machos cantam muito, e as fêmeas arrancam-se penas!

Ao acasalar, tenha em atenção uma série de fatores, a saber:

- Ascendência e relações de consangüinidade;
- Compensar os defeitos com as qualidades dos elementos que compõe o casal, bem como os diferentes tipos de pena;
- Cores e fatores ligados ao sexo.

Alguns exemplos:

1- Do cruzamento de um gloster de plumagem intensa e um nevado, dá origem a 50% intensos e 50% nevados

2- Acasalando dois nevados só terão filhos



