

Bavet Cauda Longa

Gianluca Moroni - Campeão Mundial em Burel Cauda Longa
Fotos: M. Q. Garcia



A seleção do Diamante de Cauda Longa atingiu nos últimos anos, graças ao trabalho escrupuloso de alguns criadores, pássaros de nível excelente.

Faz alguns anos que a Comissão Técnica,

I.E.I., redigiu o Standard desta espécie e que ajudou no trabalho de seleção destes criadores. Com o texto atual a Comissão Técnica quer melhorar e aperfeiçoar o trabalho realizado nos anos anteriores.

A intenção é evidenciar as diferenças fenotípicas das diversas mutações para de modo mais fácil reconhecer e diferenciar estas mutações.

EFEITOS DAS MUTAÇÕES

STANDARD DO DIAMANTE CAUDA LONGA (*PHOEPHILA ACUTICAUDA*) NOMENCLATURA OFICIAL

ANCESTRAL

Define os exemplares ancestrais, seja de bico amarelo (*P. A. Acuticauda*), ou seja, debico vermelho (*P. A. Heckii*).

CANELA

Define os exemplares mutados para Canela (transmissão hereditária: sexoligado) seja bico amarelo ou vermelho.

FEOMELANICO ou FEO

Define os exemplares mutados em Feo (transmissão hereditária: recessiva) seja de bico amarelo ou vermelho.

TOPÁZIO

Define os exemplares mutados em Topázio (transmissão hereditária: recessiva) seja bico amarelo ou vermelho.

INO

Define os exemplares mutados em Ino (transmissão hereditária: sexo ligado) seja debico amarelo ou vermelho.

CINZA

Define os exemplares mutados em Cinza (transmissão hereditária: recessiva) seja de bico amarelo seja de bico vermelho.

OUTRAS VARIEDADES

Define os exemplares com novas mutações não padronizadas, mas não as combinações.

DENOMINAÇÃO	FENÓTIPO	SEMELHANÇAS E DIFERENÇAS
CANELA	Todas as zonas normalmente negras (babador, calção, freio) se tomam marrom escuro. O cinza da cabeça se toma perolado claro.	Com o Topázio e Feo: dorso marrom avermelhado e não bege. Cor do desenho marrom escuro como no topázio e não ferrugem como no feo.
FEOMELANICO	Aspecto geral bege tendendo ao avermelhado claro. A mesma cor se estende a cabeça em tons mais claros do que no dorso sem reflexos perolados como no Topázio (ausência de eumelanina). Babador, calção, freio: marrom vermelho ferrugem o mais escuro possível.	Com o Topázio: dorso e ventre similares ainda mais se o Topázio apresenta um bloco Cabeça/pescoço um pouco mais acinzentado; cabeça sem reflexos perolados/azulados.
TOPÁZIO	Aspecto geral bege, semelhante ao feo, mas com reflexos acinzentados no pescoço e sobre a cabeça devido a presença ainda mais reduzida de eumelanina. Babador, calção, freio: marrom escuro.	Com o Feo: diferença mais substancial na cor da cabeça não somente bege, mas velada de cinza. Dorso um pouco mais acinzentado que o Feo. Babador, calção e freio mais escuro. Destaca a cor da cabeça e dorso. Dorso bege em relação ao bege avermelhadodo Feo. Babador calção e freio marrom escuro similar a cor do desenho do canela e diferente do marrom ferrugem mais escuro do Feo.
INO	Aspecto geral esbranquiçado com dorso ligeiramente mais escuro pela presença de eumelanina canela. Babador, calção e freio: marrom claro, apagado.	Diferente de todas as outras mutações e assim não confundível. Olhos vermelhos.
CINZA	Aspecto geral cinza oxidado e brilhante sem traços de marron (ausência de eumelanina canela e de feomelanina). Babador, calção e freio negros, peito cinza prateado.	Diferente de todas as outras mutações e assim não confundível.

Nota: todos os nomes são precedidos de Diamante Cauda Longa abreviado D. cauda longa.

