

COMPORTAMENTO DE *Picumnus cirratus* (AVES , PICIDAE)

Frederico Lencioni Neto

UNIVAP - Universidade do Vale do Paraíba, Praça Candido Dias Castejon -
São José dos Campos - SP - Brasil



Pica-pau- anão (*Picumnus cirratus*)- Pintura F. Lencione Neto

INTRODUÇÃO

O nome pica-pau-anão é utilizado para denominar vulgarmente inúmeras espécies minúsculas de Picidae, do gênero *Picumnus* Temminck, 1825, incluídas entre as menores aves brasileiras (8, 7 a 16, 5 gramas).

Picumnus cirratus tem ampla distribuição geográfica, sendo encontrado das Guianas a Bolívia, Paraguai, norte da Argentina e Brasil. *Picumnus cirratus cirratus* Temminck, 1825 habita o sul da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná; *P. c. maconelli* Sharpe 1901, vive nas Guianas e norte do Brasil e *P. c. pilcomayensis* Hargett 1891, no norte da Argentina, Paraguai e sudeste do Mato Grosso (Pinto, 1944).

Em São Paulo, local das observações, *Picumnus cirratus* é encontrado com freqüência nas bordas da mata primária, nas matas de restinga e nas matas secundárias, sendo nesta última uma das espécies mais comuns. Chegam as áreas arborizadas das zonas urbanas, tais como jardins e quintais.

ÁREAS DE ESTUDO

1- Uma área de mata secundária localizada no município de Jacareí, Vale do Paraíba - S.P., na fazenda Santana do Rio Abaixo (23 12'S - 45 57'W). Esta mata originou-se do abandono de antiga plantação de café devido ao esgotamento do solo no início do século. A cobertura original primitiva de Floresta Estacional Semidecidual hoje acha-se descaracterizada pela ocupação humana, que passou a utilizar a maior parte da região para pastagens, culturas permanentes e cíclicas.

2- Uma área de mata primária, região de Floresta Ombrófila Densa, localizada na Serra do Mar, entre os municípios de Salesópolis e Caraguatatuba (23 45'S - 45 31'W). Esta área que denominamos de transição, localiza-se entre o leito da rodovia de serviço da Petrobrás e a Mata Atlântica. Originou-se do desmatamento da vegetação original durante a construção da rodovia. O seu aspecto atual é de uma mata secundária, rala e perturbada.

3- Uma área localizada no município de Caraguatatuba, S.P. onde estava sendo implantado o loteamento denominado Jardim Britânia, entre o mar e a rodovia que liga esta cidade e São Sebastião (23 41'S 45 22'W). Apresenta vestígios da Floresta Umbrofila Densa das Terras Baixas, na faixa que vai de 5 a 50 metros acima do nível do mar. Esta floresta ocupava toda baixada litorânea até as colinas do sopé da Serra do Mar. O aspecto atual com a retirada das árvores maiores é de uma vegetação secundária. É comum a presença da palmeira *Attalea* sp. conhecida localmente como indaiá-açu.

FIG. 1



